

武漢肺炎

傳染方式

防疫專線：1922



2019 nCoV
新型冠狀病毒



飛沫



接觸



動物接觸

潛伏期

症狀

14天



發燒 > 38度



四肢無力



乾咳



呼吸困難/肺炎

務必如實告知過去14天
旅遊史、職業及接觸史

預防

有呼吸道症狀或在醫院

外科口罩

接觸身體/臉部前後
肥皂洗手或
酒精性乾洗手



勤量體溫



勤洗手



有呼吸道症狀
戴外科口罩



減少進出
公眾場所

流行病學

發病前14天內

與相關病例
有密切接觸

或發病前14天內

於中國疫區*
旅遊或居住

*疫區已不限武漢

密切接觸：

- 醫護或同住者，無防護，>15分鐘面對面之接觸或照護
- 飛機及長程(>1hr)交通工具同排及前後兩排及空服員
- 同班上課之同學，固定位置3公尺內之同事

- 戴口罩：
- 發燒+咳嗽
- 前往醫院



檢驗陰性：(一)
自主健康管理14天

檢驗陽性：(+)
接觸者健康監測14天

一般民眾使用外科口罩即可
無需囤積N95

f 抓住那個醫生

就醫

極可能病例，
24hr內通報

症狀+接觸史

檢驗*2套

2套間隔24小時